



Parásitos Internos 101 **Para niños**



Las ovejas y las cabras pueden verse afectados por numerosos parásitos internos, pero los que causan mayores problemas son el gusano barbero y las coccidias.

Parásitos Internos 101 Los parásitos pueden ser mortales, especialmente para los corderos / cabritos, madres lactantes y cualquier animal que sea delgado y/o mal alimentado..



Las ovejas y las cabras se infectan con gusanos cuando comen larvas infecciosas (forma inmadura de gusano) en la hierba, así que no las dejes pastar demasiado cerca del suelo. Se infectan con coccidias cuando ingieren alimento y agua contaminados con materia fecal o viven en un ambiente contaminado. Asegúrese de mantener los corrales secos y limpiar los comederos y bebederos. Los gusanos son más un problema en los pastos de los pastizales, mientras que los coccidios son un riesgo mayor en el establo o en los lotes de tierra.

El gusano barbero es el parásito más mortal. Chupa **SANGRE** y causa anemia (membranas mucosas pálidas) y, a veces, produce el cuello o mandíbula de "botella" (líquido debajo de la mandíbula).




Las coccidias son parásitos protozoarios microscópicos unicelulares. No se pueden ver, pero pueden causar problemas en el intestino delgado. La desagradable diarrea es el síntoma común.



Las tenias son el único parásito interno que se puede ver en las heces o caca. Si bien se ven "asquerosos", generalmente no causan ningún daño.



Solo debe administrar medicamentos antiparasitarios a ovejas/cabras que muestren signos obvios de infección por gusanos, como anemia (pérdida de sangre) o pérdida de peso. Los aditivos en el alimento o mineral pueden ayudar a prevenir brotes de coccidiosis. Consulte con un veterinario si necesita tratar a sus animales para la coccidiosis.



Escrito por Susan Schoenian
Traducido por Leyla Rios.
Revisado por Jessica Quijada.
(2023). Visite www.wormx.info
para obtener más información.