

COMBINACIÓN DE TRATAMIENTOS

El Consorcio Americano para el Control de las Parasitosis en Pequeños Ruminantes (del inglés *ACSRPC*; wormx.info) recomienda que el tratamiento de las parasitosis clínicas en pequeños ruminantes, se realice con combinación de drogas



ALBENDAZOL (VALBAZEN®) + MOXIDECTINA (CYDECTIN®) + LEVAMISOL (PROHIBIT®, LEVAMED®)

La combinación de tratamientos implica el uso simultáneo de dos o más fármacos (antiparasitarios), contra el mismo parásito. El propósito es eliminar la mayor cantidad de parásitos como sea posible. Por ende, los parásitos que sobreviven a un principio activo pueden ser eliminados por la segunda o tercera droga utilizada. Para que exista un beneficio, cada droga incorporada en la combinación debe reducir el conteo de huevos en materia fecal en al menos un 60%. La combinación de tratamientos con Partículas de Alambre de Óxido de Cobre (del inglés *COWP*), también puede ser efectiva (antiparasitario + *COWP*).



Los antiparasitarios combinados, no se encuentran comercialmente disponibles en Estados Unidos. Por lo cual, cada droga de la combinación debe ser administrada por separado, e idealmente en una jeringa distinta. Los antiparasitarios no deben mezclarse ya que no son químicamente compatibles. Se debe administrar la droga más efectiva de cada clase. Además, se debe usar una dosis completa de cada droga a combinar, basada en el peso exacto del animal. Utilizar solamente formulaciones orales (drench). Respetar el periodo de retiro de la droga que tiene el periodo más largo (usualmente *Cydectin*®).

La combinación de tratamientos debe administrarse solamente a animales con parasitosis clínica, en base al score o valor de *FAMACHA*®, el score (categoría) de condición corporal, el Chequeo de los Cinco Puntos® (del inglés *Five Point Check*®), u otro criterio de tratamiento selectivo (TST). El tratamiento de todos los animales del lote o rebaño, va a resultar en un incremento acelerado de resistencia a todos los antiparasitarios utilizados en la combinación. El asesoramiento veterinario es necesario para la combinación de tratamientos en cabras y camélidos, ya que usualmente se recomienda la utilización de drogas no aprobadas por el FDA.

