

# PERIPARTO

## Mayor número de huevos



Periparto significa alrededor del momento del parto.

### ¿QUÉ ES?

Pérdida temporal de inmunidad (a parásitos) alrededor al momento del parto, resultando en mayor número huevos en heces fecales.



### ¿CUÁNTO DURA?

Depende, entre dos semanas antes del parto y hasta ocho semanas después del parto.



### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Mayor concentración de huevos fecales en Ovejas/cabras conduce a un aumento de la contaminación de pasturas y mayor riesgo de infección por gusanos/lombrices en corderos/cabritos.

### ¿QUÉ PUEDES HACER AL RESPECTO?

Desparasitar las ovejas/cabras que requieran del tratamiento o que se beneficiarían más del tratamiento.



### Criterios de desparasitación, cuando:

- FAMACHA ©  $\geq 4$  puntos
- Condición corporal (CC)  $\leq 2$  puntos
- Criando o manteniendo  $\geq 3$  crías
- Al parto de Primerizas
- Hembras lactantes alta producción

### OTRAS ESTRATEGIAS

- Incrementar proteína ración gestación tardía.
- Criar Cordero/cabrito fuera de época o en estabulación. Alimento con BioWorma® en período periparto. Razas más resistentes y seleccionar para resistencia a parásitos



Traducido al español por Dr. Homero Salinas-Gonzalez, Lincoln University.  
Revisado por: Leonor Sicalo Gianechini DVM, estudiante Ph.D. University of Georgia  
y Leyla Ríos MSc, Ph.D., Mississippi State University.